

# LEVOTHYROX<sup>®</sup> comprimé sécable

## Lévothyroxine sodique



**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Levothyrox et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Levothyrox ?
3. Comment prendre Levothyrox ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Levothyrox ?
6. Informations supplémentaires

### **1. QU'EST-CE QUE LEVOTHYROX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la thyroïde),
- circonstances où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la thyroïde).

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVOTHYROX ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### **Ne prenez jamais Levothyrox dans les cas suivants :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lévothyroxine ou à l'un des autres composants contenus dans Levothyrox,
- si vous souffrez d'hyperthyroïdie (ensemble des troubles provoqués par une activité exagérée de la glande thyroïde), en dehors des hyperthyroïdies traitées par les antithyroïdiens de synthèse.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, dans certaines maladies cardiaques lorsqu'elles ne sont pas stabilisées : coronaropathies (maladies des vaisseaux irriguant le cœur), troubles du rythme cardiaque.

#### **Faites attention avec Levothyrox**

- Ce médicament pris seul ou en association avec d'autres médicaments, n'est pas un traitement de l'obésité sans hypothyroïdie ; des doses importantes peuvent être dangereuses, surtout si le traitement est associé à des anorexigènes (médicaments " coupe faim ").
- L'efficacité du traitement et les signes d'intolérance n'apparaissent qu'après un délai de 15 jours à un mois après le début du traitement.

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En règle générale, le traitement doit faire l'objet d'une surveillance clinique et biologique.

Signalez à votre médecin toute maladie ancienne ou survenant en cours de traitement, notamment :

- en cas de maladie cardio-vasculaire, en particulier coronarienne (infarctus du myocarde, angine de poitrine, troubles du rythme cardiaque),
- en cas d'insuffisance de fonctionnement des glandes surrénales.

Dans toutes ces situations, la prescription du traitement par hormones thyroïdiennes se fera au cas par cas et la surveillance des sujets sera particulièrement attentive.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement**

Ce traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, sous la surveillance de votre médecin.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Informations importantes concernant certains composants de Levothyrox**

Ce médicament contient du lactose.

### **3. COMMENT PRENDRE LEVOTHYROX ?**

#### **Posologie**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin.

Elle varie suivant le degré de l'hypothyroïdie, l'âge et la tolérance de chaque individu au traitement.

#### **Mode d'administration**

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.

#### **Fréquence d'administration**

Ce médicament est à prendre de préférence le matin, à jeun.

### Durée du traitement

L'hypothyroïdie étant dans la majorité des cas, une maladie définitive, le traitement doit être poursuivi indéfiniment.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

### Si vous avez pris plus de Levothyrox que vous n'auriez dû

S'il s'agit d'une intoxication aiguë, il est impératif de suspendre le traitement et de consulter votre médecin.

### Si vous oubliez de prendre Levothyrox

Si une dose a été omise, reprenez le traitement sans augmenter les doses.

Si plusieurs doses ont été omises, contactez votre médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Levothyrox est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- aggravation d'une maladie cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde, troubles du rythme cardiaque)
- signes d'hyperthyroïdie (palpitations, insomnie, excitabilité, tremblements, élévation de la température, sueurs, amaigrissement rapide, diarrhée) : prévenez votre médecin
- chez l'enfant, possibilité d'hypercalciurie (taux de calcium trop élevé dans les urines)
- possibilité de réactions allergiques

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER LEVOTHYROX ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Levothyrox après la date d'expiration mentionnée sur la boîte après EXP. Cette date fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient Levothyrox 25 µg, 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg, 150 µg, 175 µg ou 200 µg comprimé sécable ?**

La substance active est :

Lévothyroxine sodique .....	25 µg
.....	50 µg
.....	75 µg
.....	100 µg
.....	125 µg
.....	150 µg
.....	175 µg
ou .....	200 µg

pour un comprimé sécable.

Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, gélatine, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

## Qu'est-ce que Levothyrox et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé sécable blanc.

Chaque boîte contient 28, 30, 50 (modèle hôpital), 90 ou 100 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'AMM :** Merck Santé s.a.s.

37 rue Saint-Romain - 69379 LYON CEDEX 08

**Exploitant :** Merck Serono s.a.s.

37 rue Saint-Romain - 69379 LYON CEDEX 08

**Fabricants :** Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 - 64293 DARMSTADT - Allemagne

Merck Santé s.a.s. - 2 rue du Pressoir vert - 45400 SEMOY

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :** 11/2009.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).