

Notice : information de l'utilisateur

Vytaros 2 mg/g crème

Vytaros 3 mg/g crème

Alprostadil

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Vytaros et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vytaros
3. Comment utiliser Vytaros
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Vytaros
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Vytaros et dans quel cas est-il utilisé ?

Vytaros existe en deux dosages de 200 et 300 µg d'alprostadil dans 100 mg de crème. Vytaros est utilisé dans le traitement des troubles de l'érection (ou dysfonction érectile) chez les hommes à partir de 18 ans. Les troubles de l'érection se définissent par une incapacité à atteindre ou à maintenir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel. Il existe plusieurs causes des troubles de l'érection, notamment la prise de médicaments pour d'autres affections, une mauvaise circulation sanguine au niveau de la verge, des lésions nerveuses, des troubles émotionnels, une trop grande consommation de tabac ou d'alcool et des troubles hormonaux. Les causes des troubles de l'érection sont souvent multiples. Le traitement des troubles de l'érection consiste à changer de médicament si vous en prenez un qui provoque des troubles de l'érection, à prendre des médicaments prescrits sur ordonnance, à utiliser un dispositif médical produisant une érection, à subir une intervention chirurgicale corrigeant la circulation sanguine irrigant le pénis, à recevoir une prothèse pénienne et à consulter un psychologue. L'érection apparaît dans un délai de 5 à 30 minutes suivant l'administration de Vytaros. Vous ne devez en aucun cas interrompre la prise d'un médicament qui vous aurait été prescrit, sauf si votre médecin vous le demande.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vytaros

N'utilisez jamais Vytaros

- si vous présentez des troubles sous-jacents comme une chute de la tension artérielle lorsque vous passez de la position couchée ou assise à la position debout, si vous avez des antécédents d'infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou de syncope (sensations de vertige),
- si vous êtes allergique à l'alprostadil ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,

- si vous présentez un trouble susceptible d'entraîner une érection prolongée ou une affection comme une anémie falciforme ou que vous êtes porteur du trait drépanocytaire, si vous présentez une hyperplaquettose ou une polyglobulie, si vous êtes atteint d'un myélome multiple ou d'une leucémie,
- si vous avez une malformation du pénis,
- si vous avez une inflammation ou une infection du pénis,
- si vous présentez un risque de thrombose veineuse,
- si vous présentez un syndrome d'hyperviscosité qui pourrait entraîner une érection prolongée,
- s'il vous a été demandé de ne pas avoir de rapports sexuels du fait de raisons de santé telles que des problèmes cardiaques ou la survenue récente d'un accident vasculaire cérébral (AVC),
- si votre partenaire est enceinte, qu'elle allaite ou est en âge de procréer, à moins que vous n'utilisiez un préservatif.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Vytaros si vous avez des antécédents des effets locaux suivants qui ont été observés sous Vytaros :

- érections se prolongeant plus de 4 heures (priapisme)
- hypotension symptomatique (sensations de vertige)
- insuffisance hépatique et/ou rénale, il est possible qu'il soit nécessaire d'utiliser une dose plus faible en raison d'altérations du métabolisme
- perte de connaissance (évanouissement)

Un préservatif doit être utilisé dans les situations suivantes :

- votre partenaire est enceinte ou allaite
- votre partenaire est en âge de procréer
- pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles
- lors d'un rapport sexuel oral ou anal

Seuls des préservatifs en latex ont été étudiés. Le risque qu'un préservatif fabriqué dans une autre matière puisse être endommagé n'est pas connu.

Autres médicaments et Vytaros

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Il n'a pas été réalisé d'étude sur l'utilisation de Vytaros avec d'autres médicaments employés pour traiter les troubles de l'érection. Par conséquent, si vous prenez d'autres médicaments pour les troubles de l'érection, abstenez-vous de toute association avec Vytaros, car cela risquerait d'entraîner des symptômes comme des sensations de vertige, une perte de connaissance et des érections prolongées. Vytaros n'a pas été étudié dans les cas où une prothèse pénienne était implantée ou lors d'administrations de médicaments relâchant la musculature lisse comme la papavérine ou de médicaments utilisés pour induire des érections tels que les antagonistes des récepteurs alpha adrénergiques (par exemple, la phentolamine par voie intracaverneuse ou le moxisylyte). Il existe un risque de priapisme (érection anormalement prolongée et douloureuse) en cas d'association.

Bien que non étudié, il est possible que Vytaros ait un effet moindre s'il est pris en association avec des traitements de l'hypertension artérielle, des décongestionnants ou des anorexigènes (coupe-faim).

Si vous prenez des médicaments visant à prévenir la formation de caillots sanguins, n'utilisez pas Vytaros car il existe un risque accru de saignement ou de sang dans les urines.

En association avec des médicaments de l'hypertension artérielle, Vytaros peut augmenter les symptômes de sensations vertigineuses et de perte de connaissance, en particulier chez le sujet âgé.

Grossesse, allaitement et fertilité

Il n'existe pas de données sur l'utilisation de Vytaros chez la femme enceinte. Les femmes enceintes ne doivent pas être exposées à Vytaros.

Il est déconseillé d'utiliser Vytaros pendant l'allaitement.

Chez l'homme, on ne sait pas si Vytaros a un effet sur la fertilité masculine.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vytaros peut provoquer des sensations de vertige ou des pertes de connaissance. Attendez 1 à 2 heures après l'administration pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

3. Comment utiliser Vytaros

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Vytaros existe en deux dosages de 200 et 300 µg d'alprostadil dans 100 mg de crème. Vytaros doit être utilisé en fonction de ce qui est nécessaire pour obtenir une érection. Chaque contenant Vytaros AccuDose est à usage unique et doit être éliminé comme il convient après utilisation.

Pour une érection : la dose initiale doit être recommandée par un médecin. **N'ajustez pas la dose vous-même.**

Consultez votre médecin qui vous indiquera la technique à utiliser pour administrer correctement le médicament ainsi que les ajustements de dose nécessaires.

N'appliquez pas Vytaros plus de 2 à 3 fois par semaine et seulement une seule fois par période de 24 heures.

L'effet apparaît dans un délai de 5 à 30 minutes suivant l'administration. La durée de l'effet est d'environ 1 à 2 heures. Cependant, la durée effective est variable d'un patient à l'autre.

Appliquez Vytaros à l'extrémité du pénis (méat) dans les 5 à 30 minutes précédant une tentative de rapport sexuel en suivant les instructions ci-dessous :

1. Lavez-vous les mains avant d'appliquer Vytaros. Retirer le contenant AccuDose du sachet en pellicule d'aluminium, en tirant vers le bas la languette située à l'entaille au haut de l'emballage. Sortir le contenant AccuDose du sachet. Conservez le sachet pour l'élimination du contenant AccuDose usagé ultérieurement. Retirez le capuchon de l'embout du contenant AccuDose. (Figure 1)




Figure 1

2. Saisissez l'extrémité du pénis d'une main et manipulez délicatement pour élargir l'ouverture du méat

urétral (orifice du pénis). Remarque : si vous n'êtes pas circoncis, commencez par décalotter le gland et maintenez le prépuce rabattu avant d'élargir le méat. (Figure 2)




Figure 2

3. Tenir le corps du dispositif AccuDose entre ses doigts et placer l'embout du contenant au-dessus de l'ouverture du pénis. Appuyer délicatement sur le piston du contenant avec le pouce ou l'index, jusqu'à ce que tout le contenu du contenant AccuDose soit appliqué au niveau de l'ouverture du pénis et de la peau qui l'entoure (Figure 3). **Remarque : n'introduisez pas l'embout du contenant AccuDose dans le méat urétral.**




Figure 3

4. Tenez le pénis à la verticale pendant environ 30 secondes afin de permettre une bonne pénétration de la crème. Il est probable que l'ouverture du pénis ne puisse pas contenir toute la crème. Le surplus de crème varie en fonction du patient ; il existe des cas fréquents dans lesquels la moitié de la dose reste au bord de l'ouverture du pénis. N'utilisez pas de deuxième contenant AccuDose pour compenser la crème n'ayant pas pénétré dans le méat. Faire pénétrer tout excès de crème dans l'ouverture du pénis et dans la peau qui entoure le site d'application, en massant délicatement avec le bout du doigt.
5. Attention, chaque dose de Vytaros est à usage unique. Remettez le capuchon sur le contenant AccuDose et placez celui-ci dans le sachet en aluminium qui a été ouvert, fermez le sachet en le repliant et éliminez conformément à la réglementation en vigueur.
6. Vytaros peut provoquer une irritation des yeux. Lavez-vous les mains après avoir appliqué Vytaros.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Vytaros n'est pas indiqué chez l'enfant ou l'adolescent de moins de 18 ans.

Si vous avez utilisé plus de Vytaros que vous n'auriez dû

Il n'a pas été signalé de surdosage nécessitant un traitement lors de l'utilisation de Vytaros. Un surdosage en Vytaros est susceptible d'entraîner une chute de la tension artérielle, une perte de connaissance, des sensations de vertige, des douleurs persistantes au niveau du pénis et éventuellement une érection se prolongeant plus de 4 heures. Cela peut être à l'origine d'une aggravation permanente des troubles de

l'érection. Appelez votre médecin dans les plus brefs délais si vous présentez l'un de ces effets.

Si vous avez utilisé trop de Vytaros. Prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245). Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Vytaros peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Prenez immédiatement contact avec votre médecin en cas d'érection durant plus de 4 heures. Il se peut que votre médecin réduise votre dose de Vytaros ou qu'il interrompe votre traitement.

Effets indésirables fréquents (peut toucher plus d'1 patient sur 10) :

Vous-même :

- douleurs locales légères à modérées, sensation de brûlure ou douleur et rougeur du pénis,
- éruption cutanée,
- prurit (démangeaisons) génital,
- œdème du pénis
- inflammation du gland du pénis (balanite)
- picotements au niveau du pénis, douleurs pulsatiles, engourdissement, sensation de brûlure

Votre partenaire :

- Sensations de brûlure ou démangeaisons de légère intensité, vaginite
Cet effet peut être dû au médicament ou à l'acte de pénétration vaginale. Le recours à un lubrifiant à base d'eau peut faciliter la pénétration vaginale.

Effets indésirables peu fréquents mais potentiellement graves (peut toucher jusqu'à 1 patient sur 100) :

Vous-même :

- étourdissements/sensations de vertige
- érection se prolongeant pendant plus de 4 heures
- perte de connaissance
- tension artérielle faible ou fréquence cardiaque rapide
- douleurs au point d'application ou dans les membres
- sténose (rétrécissement) urétrale
- sensibilité exagérée
- démangeaisons du pénis
- éruption génitale
- douleurs du scrotum
- sensation de lourdeur et de tension au niveau des organes génitaux
- absence de sensibilité au niveau de la verge
- inflammation des voies urinaires

Votre partenaire :

- prurit vulvo-vaginal

*Une augmentation de l'activité sexuelle/physique sous Vytaros peut majorer le risque d'infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou d'accident vasculaire cérébral (AVC) chez les patients présentant des affections sous-jacentes ou des facteurs de risque (voir rubrique 2).

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Durée des effets indésirables :

La plupart des effets sont de courte durée et disparaissent sous 1 à 2 heures.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Belgique	Luxembourg
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.afmps.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be	Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Vytaros

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas Vytaros après la date de péremption indiquée sur la boîte, le sachet et l'étiquette du contenant AccuDose après Exp.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

Ne pas congeler.

Les sachets non entamés peuvent être conservés par le patient en dehors du réfrigérateur pendant 3 jours au maximum avant utilisation, à une température inférieure à 25 °C.

Une fois ce délai expiré, le produit doit être éliminé s'il n'a pas été utilisé.

Chaque applicateur est à usage unique.

Après ouverture, utiliser immédiatement, éliminer tout contenant utilisé partiellement.

A conserver dans le sachet d'origine, à l'abri de la lumière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Vytaros

- La substance active est l'alprostadil.
Chaque contenant contient 200 microgrammes d'alprostadil dans 100 mg de crème (2 mg/g).

Chaque contenant contient 300 microgrammes d'alprostadil dans 100 mg de crème (3 mg/g).
Vytaros est disponible en boîtes de quatre (4) contenants unidose.

- Les autres composants sont l'eau purifiée, l'éthanol anhydre, le laurate d'éthyle, la gomme de guar d'hydroxypropyle, le chlorhydrate de dodécyl-2-(N,N-diméthylamino)-propionate, le phosphate monopotassique, l'hydroxyde de sodium pour ajustement du pH, l'acide phosphorique pour ajustement du pH.

Aspect de Vytaros et contenu de l'emballage extérieur

Vytaros est une crème de couleur blanche à blanc cassé se présentant dans un contenant unidose, AccuDose.

AccuDose est un contenant qui se compose d'un piston/bouton-poussoir, d'un cylindre formant le corps du dispositif et d'un capuchon de protection.

Chaque contenant est fourni dans un sachet protecteur.

Les sachets sont constitués de papier laminé doublé d'un feuillet d'aluminium. Les éléments composant le contenant sont en polypropylène et en polyéthylène.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde

Fabricant

Takeda UK Limited Takeda House
Mercury Park, Wycombe Lane
Wooburn Green, High Wycombe, HP10 0HH
Royaume-Uni

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Allemagne

Laphal Industries
Avenue de provence
13190 Allauch
France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Vytaros 2 mg/g: BE445715

Vytaros 3 mg/g: BE445724

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

2 mg/g crème

Etat membre	Nom du médicament proposé
Allemagne	Vitaros® HEXAL® 200 Mikrogramm/100 mg Creme
Royaume-Uni	Vitaros 2mg/g cream
France	Vitaros 200 microgrammes, crème
Espagne	VIRIREC 2 mg/g Crema

Suède	Vitaros 2 mg/g Kräm
Irlande	Vitaros 2 mg/g Cream
Belgique	Vytaros 2 mg/g crème
Luxembourg	Vytaros 2 mg/g crème
Pays-Bas	Vitaros 200 microgram Crème

3 mg/g crème

Etat membre	Nom du médicament proposé
Allemagne	Vitaros® HEXAL® 300 Mikrogramm/100 mg Creme
Royaume-Uni	Vitaros 3 mg/g cream
France	Vitaros 300 microgrammes, crème
Espagne	VIRIREC 3 mg/g Crema
Suède	Vitaros 3 mg/g Kräm
Irlande	Vitaros 3 mg/g Cream
Belgique	Vytaros 3 mg/g crème
Luxembourg	Vytaros 3 mg/g crème
Pays-Bas	Vitaros 300 microgram Crème

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2014.

Autres sources d'informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <http://www.ema.europa.eu/>.

EFFETS APRES APPLICATION :

Vytaros agit en 5 à 30 minutes, délai au bout duquel vous pouvez avoir un rapport sexuel. Une fois le médicament administré, une stimulation sexuelle préliminaire aide à parvenir à l'excitation et à obtenir une érection. Une dose efficace de Vytaros doit permettre une érection suffisante pour un rapport sexuel. La durée de l'effet est d'environ 1 à 2 heures. Cependant, la durée effective est variable d'un patient à l'autre et dépend de la dose du médicament. Il se peut que Vytaros n'induisse pas une érection comparable à celles que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune. Certains patients pourront éventuellement présenter de légères douleurs, une sensation de brûlure et un inconfort dans la région du pénis ou de l'aîne. Il est en outre possible que votre érection se prolonge pendant un certain temps après l'orgasme ou l'éjaculation. Une fois l'érection terminée, il se peut que vous ressentiez une sensation de lourdeur, de tension et de chaleur au niveau du pénis qui peut être légèrement sensible au contact. Ces effets sont normaux et peuvent durer quelques heures.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET ASPECTS PRATIQUES :

C'est vous-même et votre médecin qui déterminerez la dose de Vytaros appropriée. Si l'érection ne peut pas être maintenue pendant le temps nécessaire à la stimulation préliminaire et au rapport sexuel, il est possible qu'il faille augmenter votre dose. De même, si une érection dure plus longtemps que souhaité ou si les effets indésirables ne sont pas bien tolérés, une réduction de votre dose peut s'avérer nécessaire. Appelez votre médecin si vous pensez avoir peut-être besoin d'un ajustement de dose.

Facteurs pouvant améliorer l'érection :

- Etre bien reposé.
- Stimulation sexuelle préliminaire avec votre partenaire ou auto-stimulation en position assise ou couchée après application de Vytaros.
- Exercices musculaires pelviens, consistant par exemple à contracter et à relâcher plusieurs fois les muscles pelviens et fessiers. Ce sont les muscles mis en jeu pour arrêter le jet d'urine.
- Positions variées susceptibles de faciliter l'irrigation sanguine du pénis et non la restreindre.

Facteurs susceptibles de diminuer l'érection :

- Anxiété, fatigue, tension ou consommation excessive d'alcool.
- Le fait d'uriner immédiatement après l'application peut entraîner une perte du médicament.